

PROGRAMA GENERAL TOMATE



PROGRAMA GENERAL DE NUTRICIÓN FOLIAR				
Producto	Dosis	Objetivos	Momento de aplicación	Observaciones
Ibisoil Defense + Borocal S	300 cc/ 100 L de agua + 100 grs./100 de agua	Disminución estrés pos trasplante.	Aplicar un día antes del primer riego.	Mezcla compatible con fitosanitarios
Ibicuper L + Borocal S	200 cc/100 L de agua + 100 grs./100 L de agua	Fitofortificar a la planta frente al ataque de enfermedades. Mejor estructuración de los tejidos	Aplicar desde 30 días pos trasplante y repetir a cada 15 días	Mezcla NO compatible con fitosanitarios de reacción alcalina fuerte.
Algae Plus + Fito K 30/20	300 cc/100 L de agua + 250 cc/100 L de agua	Estimular crecimiento vegetativo y producción de fitoalexinas	Aplicar a los 15 días de la aplicación anterior	No mezclar con aceite mineral, compuestos cúpricos, compuestos de reacción alcalina, Dicofol y Dimetoato. Con días fríos preferir aplicación de Agroxilato N en reemplazo de Algae Plus.
Agroxicuaja	300 a 400 cc/ 100 L de agua	Amarre de frutos	Aplicar cada 7 días, durante la etapa de floración	Mezcla compatible con fitosanitarios .
Potasión + Green Up	500 cc/100 L de agua + 300 cc/100 L de agua	Engorde de fruto, mejor condición de almacenaje	Aplicar desde fruto cuajado y repetir 15 días hasta el final de la cosecha	Alternar aplicaciones de Potasión + Green Up con aplicaciones de Potasión + Borocal.
Potasión + Borocal S	500 cc/100 L de agua + 100 grs./100 L de agua	Engorde de fruto, mejor condición de almacenaje, engrosamiento de la cutícula.	Aplicar desde fruto cuajado y repetir cada 15 días hasta el final de la cosecha	
PROGRAMA GENERAL DE NUTRICIÓN AL SUELO (Fertirriego)				
Producto	Dosis	Objetivos	Momento de aplicación	Observaciones
Ibisoil Ca Flow + Starter Ca	100 KG/HA + 3 KG/HA	Aporte de calcio nutricional, estimular crecimiento radicular	Desde 5 días pos trasplante hasta cuaja del último racimo	Parcializar de la siguiente forma: 5 kg/HA de Ibisoil Ca Flow + 1 KG/HA de Starter Ca una vez por semana (hasta agotar productos).
Fito K 40/20	4 L/HA	Crecimiento inicial, fitofortificar a la planta frente al ataque de enfermedades radiculares	15 días post trasplante	Aplicar una vez en riego corto, localizado junto a las raíces
Floramec Plus	20 L/HA	Inducción de floración, mayor producción de flores y acortamiento de entrenudos	25 días post plantación	Parcializar de la siguiente forma: 10 L/HA de Floramec a los 25 días pos trasplante y repetir a los 7 días .El producto debe quedar localizado junto a las raíces. No mezclar con Ibisoil Ca.
Agroxilato K	30 L/HA a 50 L/HA	Mayor llenado de frutos y mejor condición de guarda	Desde inicios de crecimiento de fruto hasta final de cosecha.	Parcializar en dosis de 3 L/HA/ semana junto con fertilización potásica. Aplicar dosis mayores tomate de invernadero de alto rendimiento o para variedades con problemas de calibre.
PROGRAMA GENERAL DE NUTRICIÓN AL SUELO (Riego tradicional)				
Producto	Dosis	Objetivos	Momento de aplicación	Observaciones
Ibisoil Ca Flow + Starter Ca	50 KG/HA + 3 KG/HA	Aporte de calcio nutricional, estimular crecimiento radicular	Aplicar justo antes del primer riego de la temporada, para asegurar que el producto sea incorporado.	Aplicar sobre suelos húmedo con pitón o bomba de espalda dirigido a la hilera de plantación. Regar inmediatamente después.