



Programa general de nutrición

CEBOLLAS

Av. Los Vientos 19.930, Bodega L • Ciudad de los Valles • Pudahuel, Santiago

Fonos: 56 - 2 23078780 • 56 - 2 23078706 • info@ibiterra.com • www.ibiterra.com

Zonal Norte Chico • Onofre Salas • +56 9 82595265 • osalas@ibiterra.com

Zonal Centro • Iván Herrera Pérez • +56 9 68137099 • i.herrera@ibiterra.com

Zonal Centro Sur • Diego Pizarro • +56 9 3373 9002 • dpizarro@ibiterra.com

Zonal Sur • Alvaro Fernández • + 56 9 44085882 • afernandez@ibiterra.com

Programa general de nutrición CEBOLLAS



Aplicación Foliar

Aplicación Suelo (Fertilirriego)

Producto	Dosis (cc o grs/100 L) (Kg/L/ha)	Descripción / Objetivo	Aplicación
	500 cc/100L de agua + 100 gr/100 L de agua	Disminuir el estrés post trasplante.	Aplicar previo a la cosecha del almácigo.
	1 Kg/ha + 1 Kg/ha	Estimular crecimiento vegetativo.	7 días post trasplante.
	3 L/ha + 1 Kg/ha	Estimular crecimiento inicial y producción de fitoalexinas. Fitofortificar a la planta frente al ataque de enfermedades.	15 días post trasplante. Comenzar con Fito K 30/20 y alternar con aplicaciones de Ibicuper Zn, cada 15 días.
	1, 5 L/ha + 3 L/ha	Estimular crecimiento vegetativo. Fitofortificar a la planta frente al ataque de enfermedades.	Aplicar 30 días pos trasplante.
	1, 5 L/ha + 3 L/ha	Estimular crecimiento vegetativo. Fitofortificar a la planta frente al ataque de enfermedades.	Aplicar 10 días de la aplicación anterior.
	4 L/ha + 2 L/ha	Llenado de bulbillos. Mejorar vida post cosecha.	Realizar 2 aplicaciones: 1) 45 días antes del último riego. 2) 30 días antes del último riego.
Producto	Dosis (L/Kg/ha)	Descripción / Objetivo	Aplicación
	50 Kg/ha + 3 L/ha	Aporte de calcio nutricional, estimular crecimiento radicular.	Parcializar de la siguiente forma: 5 kg/ha de Ibisoil Ca + 1 kg/ha de Starter Ca una vez por semana (hasta agotar producto).
	8 L/ha	Estimular crecimiento radicular.	Aplicar en el último tercio del riego, localizado junto a las raíces. No mezclar con Ibisoil Ca y Starter Ca.
	4 L/ha	Crecimiento inicial, prevención de Phytophthora y enfermedades radiculares.	15 días pos trasplante. Aplicar una vez en riego corto, localizado junto a las raíces.
	30 L/ha	Llenado de bulbos y mejor condición de guarda.	Desde inicios de formación de bulbo. Parcializar en dosis de 3 L/ha/ semana junto con fertilización potásica.