Programa general de nutrición

PAPAS

Av. Los Vientos 19.930, Bodega L • Ciudad de los Valles • Pudahuel, Santiago
Fonos: 56 - 2 23078780 • 56 - 2 23078706 • info@ibiterra.com • www.ibiterra.com
Zonal Norte Chico • Onofre Salas • +56 9 82595265 • osalas@ibiterra.com
Zonal Centro • Iván Herrera Pérez • +56 9 68137099 • i.herrera@ibiterra.com
Zonal Centro Sur • Diego Pizarro • +56 9 3373 9002 • dpizarro@ibiterra.com
Zonal Sur • Alvaro Fernández • + 56 9 44085882 • afernadez@ibiterra.com

Ibiterra
AGRONUTRICION DE AVANZADA

Ibiterra
AGRONUTRICION DE AVANZADA

Programa general de nutrición **PAPAS**

Aplicación Foliar

Producto	Dosis (L/kg/ha)	Descripción	Momento de aplicación	
Amino 50®	120 gr/ 100 L de agua	Estimular crecimiento inicial.	Aplicar 15 días post emergencia.	
Ibicuper Zn®	100 gr/100 L de agua	Gluconato de Cu y Zn con efecto fungiestático que ejerce una fuerte acción estimulante del metabolismo celular. Prevención enfermedades. Mejor estructuración de los tejidos.	Aplicar desde 21 días post emergencia y repetir cada 15 días.	
Fito Zn 40/20®	200 cc/100 L de agua	Estimular crecimiento vegetativo y fitofortificar a la planta frente al ataque de enfermedades.	Aplicar a los 30 días post emergencia y repetir a los 10 días.	
Green K Plus®	700 cc/100 L de agua	Favorecer la traslocación de azúcares, estimulando la tuberización.	Inicio estado de "gancho" 45 días post emergencia, repetir a los 7 días.	
Potasión® + Borocal S®	400 cc/100 L de agua + 100 grs./100 L de agua	La acción conjunta de Borocal S y Potasión favorecen el trasporte de agua y fotoasimilados. Estimulando la tuberización y activando la fotosíntesis.	Aplicar en prefloración.	
Green K®	600 cc/100 L de agua	Engorde de tubérculos, mejor condición de almacenaje.	60 - 75 - 90 días post emergencia.	

Aplicación Suelo (Fertirriego)

Producto	Dosis (L/kg/ha)	Descripción	Momento de aplicación	
Ibisoil Ca Flow® + Starter Ca®	50 Kg/ha + 3 Kg/ha	Ibisoil Ca + Starter Ca son fuentes de calcio de alta asimilación que nos permite asegurar una adecuada nutrición cálcica y, estimular crecimiento radicular.	15 días post emergencia. Parcializar de la siguiente forma: 10 kg/ha de Ibisoil Ca + 1 Kg/ha de Starter Ca una vez por semana (hasta agotar producto).	
Fito K 40/20®	4 L/ha	Crecimiento inicial, fitofortificar a la planta frente al ataque de Phytophtora y enfermedades radiculares.	21 días post emergencia. Aplicar una vez en riego corto, localizado junto a las raíces.	
Agroxilato K®	25 L/ha	Complejo potasio-orgánico 100% asimilable, que incrementa la concentración de sales potásicas a nivel de raíz, produciendo un incremento en el potencial osmótico de la misma que favorece el llenado de bulbos y condición de guarda.	Parcializar en dosis de 3 L/ha/semana junto con fertilización potásica, durante la etapa de engorde de tubérculos.	