



Programa general de nutrición

# ZAPALLO DE GUARDA

Av. Los Vientos 19.930, Bodega L • Ciudad de los Valles • Pudahuel, Santiago  
Fonos: 56 - 2 23078780 • 56 - 2 23078706 • [info@ibiterra.com](mailto:info@ibiterra.com) • [www.ibiterra.com](http://www.ibiterra.com)  
Zonal Centro • Iván Herrera Pérez • +56 9 68137099 • [i.herrera@ibiterra.com](mailto:i.herrera@ibiterra.com)  
Zonal Centro Sur • Diego Pizarro • +56 9 3373 9002 • [dpizarro@ibiterra.com](mailto:dpizarro@ibiterra.com)  
Zonal Sur • Alvaro Fernández • + 56 9 44085882 • [afernandez@ibiterra.com](mailto:afernandez@ibiterra.com)



Aplicación Foliar

Producto	Dosis (cc o grs./100L)	Descripción / Objetivo	Aplicación	
<b>Borocal S<sup>®</sup></b> <b>Potasio<sup>®</sup></b>	100 grs/100 L de agua + 400 cc/100 de agua	Disminución estrés pos trasplante.	Previo a trasplante directamente en el speedling.	
<b>Ibicuper Zn<sup>®</sup></b>	100 grs/100 L de agua	Fitofortificar a la planta frente al ataque de enfermedades.	Aplicar desde 15 días pos trasplante y repetir a cada 15 días.	
<b>Algae Plus<sup>®</sup></b> <b>Potasio<sup>®</sup></b>	300 cc/100 L de agua + 250 cc/100 L de agua	Estimular crecimiento vegetativo, transporte de agua y nutrientes a los diferentes puntos de crecimiento.	Aplicar a los 15 días de la primera aplicación anterior.	
<b>Codibor L<sup>®</sup></b> <b>Agroxilato Zn<sup>®</sup></b>	200 cc/ 100 L de agua + 100 gr/100L de agua	Favorecer la elongación y maduración del tubo polínico.	Inicio de floración y repetir a los 7 días.	
<b>Agroxicuaja<sup>®</sup></b>	300 cc/ 100 L de agua	Amarre de frutos.	Plena flor.	
<b>Potasio<sup>®</sup></b> <b>Borocal S<sup>®</sup></b>	500 cc/100 L de agua + 100 grs/100 L de agua	Engorde de fruto, mejor condición de almacenaje.	Aplicar desde fruto cuajado y repetir cada 7 días hasta el final de la cosecha.	
<b>Potasio<sup>®</sup></b> <b>Green Up<sup>®</sup></b>	500 cc/100 L de agua + 300 cc/100 L de agua	Engorde de fruto, mejor condición de almacenaje.	Aplicar 20 días antes de cosecha y repetir a los 7 días.	

Aplicación Suelo (Fertirriego)

Producto	Dosis	Descripción / Objetivo	Aplicación	
<b>Ibisoil Ca Flow<sup>®</sup></b> <b>Starter Ca<sup>®</sup></b>	30 Kg/ha + 3 Kg/ha	Aporte de calcio nutricional, estimular crecimiento radicular.	5 días pos trasplante parcializado de la siguiente forma: 5 Kg/ha de Ibisoil Ca Flow + 1 Kg/ha de Starter Ca una vez por semana (hasta agotar producto).	
<b>Fito Zn<sup>®</sup></b>	4 L/ha	Crecimiento inicial y fitofortificar a la planta frente al ataque de enfermedades radiculares.	Aplicar una vez en riego corto, localizado junto a las raíces.	
<b>Floramec Plus<sup>®</sup></b>	20 L/ha	Inducción de floración, mayor producción de flores y acortamiento de entrenudos.	25 días post trasplante. Parcializar de la siguiente forma: 10 L/ha de Floramec Plus a los 25 días pos trasplante y repetir a los 7 días.	
<b>Agroxilato K<sup>®</sup></b>	20 L/ha	Mayor llenado de frutos y mejor condición de guarda.	Desde inicios de cuaja de fruto. Parcializar en dosis de 3 L/ha/semana junto con fertilización potásica.	