Ibiterra
AGRONUTRICION DE AVANZADA

PROGRAMA TOMATE

TRANSPLANTE Y ESTABLECIMIENTO	DESARROLLO VEGETATIVO	FLORACIÓN	CUAJA	CRECIMIENTO DEL FRUTO	MADURACIÓN DEL FRUTO	COSECHA

FOLIAR

- Ibiforte Calcio+Boro: 100 a 150 gr / HL
- Ibiforte Zinc: 200 - 300 cc / HL
- Ibiforte Potasio: 300 - 500 cc/HL
- Ibiactive Algae: 200 – 300 cc/HL
- (1) Ibiforte Magnesio: 200 – 300 cc/HL

FERTIRRIEGO

- Ibisoil Ca Flow: 40 - 60 kg/ha
- Ibicarbox Potasio: 30 - 40 lt/ha (2)
- Ibiactive Humic: 40 - 80 lt/ha
- Ibiactive Root: 5 - 8 lt/ha

Se recomienda aplicar las dosis mayores en cultivos vigorosos o en plena producción. Para el caso de plantaciones jóvenes o con bajo vigor se sugiere aplicar la menor dosis descrita
(1) Aplicar durante todo el ciclo del cultivo según análisis nutricional o al observar los primeros síntomas de deficiencia.
(2) Ajustar la dosis de Ibicarbox Potasio en una proporción del 10% del fertilizante potásico en base a sales utilizado.

VISÍTANOS
www.ibiterra.com