



Programa general de nutrición

POMACEAS

Av. Los Vientos 19.930, Bodega L • Ciudad de los Valles • Pudahuel, Santiago
Fonos: 56 - 2 23078780 • 56 - 2 23078706 • info@ibiterra.com • www.ibiterra.com
Zonal Centro • Iván Herrera Pérez • +56 9 68137099 • i.herrera@ibiterra.com
Zonal Centro Sur • Diego Pizarro • +56 9 3373 9002 • dpizarro@ibiterra.com
Zonal Sur • Alvaro Fernández • + 56 9 44085882 • afernadez@ibiterra.com





Aplicación Foliar

Producto	Dosis	Descripción / Objetivo	Aplicación
Ibicuper Zn	1,5 kg/ha	Fitofortificar a la planta frente al ataque de enfermedades y activación foliar.	Puntas Verdes.
Agroxicuaja	4 L/ha	Asegura una adecuada elongación del tubo polínico y madurez del polen, favoreciendo la cuaja.	Botón floral.
Aminogal Borocal S	3 L/ha + 1 Kg/ha	Aminoácidos específicos y algas (<i>Ascophyllum nodosum</i>) que favorecen la traslocación de azúcares, proteínas, vitaminas y hormonas hacia el fruto, que combinado con calcio foliar, mejoran la conformación del frutito.	Fruto de 2 a 3 cms. de diámetro polar.
Spring Green	2 kg/ha	Engorde de fruto, engrosamiento de la cutícula y prevención de Bitter Pit y lenticelosis.	Fruto de 4 a 5 cms. de diámetro polar.
Potasio Nutricale	4 L/ha + 4 L/ha	Engorde de fruto y prevención de Bitter pit.	Fruto de 6 a 7 cms. de diámetro polar. Repetir cada 15 días.
Protector Solar Ca 33	10 Kg/ha	Refuerza fuertemente la cutícula foliar de los frutos, protegiéndola contra el efecto nocivo de la radiación solar, la deshidratación por altas temperaturas o el ataque de plaga.	Para variedades sensibles repetir cada 15 días cuando hay riesgo de daño por radiación solar o deshidratación por altas temperaturas.
Green K Plus	5L/ha	Engorde de fruto, mejor vida de poscosecha. Inducción de color (Aplicación considerada sólo para variedades rojas).	Aplicar 30 días antes de cosecha y repetir 20 días antes de cosecha.
Green K	5 L/ha	Engorde de fruto y mejorar vida de pos cosecha (Aplicación considerada sólo para variedades verdes).	Aplicar 30 días antes de cosecha y repetir 20 días antes de cosecha.

Aplicación Suelo (Fertirriego)

Producto	Dosis	Descripción / Objetivo	Aplicación
Ibisoil Ca Flow Starter Ca	60 Kg/ha + 6 Kg/ha	Ibisoil Ca Flow + Starter Ca son fuentes de calcio de alta asimilación que nos permite asegurar una adecuada nutrición cálcica.	Desde inicios de brotación parcializar de la siguiente forma: 10 Kg/ha de Ibisoil Ca + 2 Kg/ha de Starter Ca una vez por semana (hasta agotar producto).
Fito Zn	4 L/ha	Crecimiento inicial, fitofortificar a la planta frente al ataque de enfermedades radiculares.	Inicios de brotación. Aplicar una vez en riego corto, localizado junto a las raíces.
Agroxilato K	25 L/ha	Estimula un aumento en entrada de agua y potasio a la planta, favoreciendo el crecimiento, color y firmeza de la fruta.	Desde dos meses antes de la fecha estimada de cosecha. Parcializar en dosis de 3 a 5 L/ha/ semana junto con fertilización potásica.