Ibiterra
AGRONUTRICION DE AVANZADA

PROGRAMA MANZANOS



INICIO BROTACIÓN	PRE- FLORACIÓN (boton rosado)	FLORACIÓN	CUAJA	CRECIMIENTO DEL FRUTO	TOMA DE COLOR	COSECHA	POST COSECHA
FOLIAR							
	Ibiforte Calcio+Boro: 100 a 150 gr / HL						
	Ibiforte Zinc: 200 - 300 cc / HL						
				Ibiforte Potasio: 300 - 500 cc/HL			
Ibiactive Algae: 200 - 300 cc/HL							
(1) Ibiforte Magnesio: 200 - 300 cc/HL							
					Ibiactive Sun: 1 kg/ HL		
							Ibiforte Molibdeno + Boro: 150 - 200 cc/HL
FERTIRRIEGO							
	Ibisoil Ca Flow: 40 - 60 kg/ha						
				Ibicarbox Potasio: 30 - 40 lt/ha (2)			
	Ibiactive Humic: 40 - 80 lt/ha						
					Ibiactive Root: 5 lt/ha		

Se recomienda aplicar las dosis mayores en cultivos vigorosos o en plena producción. Para el caso de plantaciones jóvenes o con bajo vigor se sugiere aplicar la menor dosis descrita

(1) Aplicar durante todo el ciclo del cultivo según análisis nutricional o al observar los primeros síntomas de deficiencia.

(2) Ajustar la dosis de Ibicarbox Potasio en una proporción del 10% del fertilizante potásico en base a sales utilizado.

VISÍTANOS
www.ibiterra.com