



TRANPLANTE Y ESTABLECIMIENTO



DESARROLLO VEGETATIVO



FLORACIÓN



CUAJA



CRECIMIENTO DEL FRUTO



MADURACIÓN DEL FRUTO



COSECHA

FOLIAR

Ibiforte Calcio+Boro: 100 a 150 gr / HL

Ibiforte Zinc: 200 - 300 cc / HL

Ibicarbox Sugar Plus: 400 a 500 cc / HL

Ibiforte Potasio: 300 - 500 cc/HL

Ibiforte Potasio: 300 - 500 cc/HL

**(1) Ibiforte Magnesio:
200 - 300 cc/HL**

Ibisoil Ca Flow: 40 - 60 kg/ha

Ibicarbox Potasio: 30 - 40 lt/ha (2)

Ibiactive Humic: 40 - 80 lt/ha

Ibiactive Root: 5 - 8 lt/ha

FERTIRRIEGO

Se recomienda aplicar las dosis mayores en cultivos vigorosos o en plena producción. Para el caso de plantaciones jóvenes o con bajo vigor se sugiere aplicar la menor dosis descrita

(1) Aplicar durante todo el ciclo del cultivo según análisis nutricional o al observar los primeros síntomas de deficiencia.

(2) Ajustar la dosis de Ibicarbox Potasio en una proporción del 10% del fertilizante potásico en base a sales utilizado.

