



FOLIAR

Ibiactive Break: 2 - 4 lt/HL

Ibiforte Calcio+Boro: 100 a 150 gr / HL

(1) Ibiforte Zinc: 200 - 300 cc / HL

Ibiforte Potasio: 300 - 500 cc/HL

Ibiactive Algae: 200 - 300 cc/HL

(1) Ibiforte Magnesio: 200 - 300 cc/HL

Ibiactive Sun: 1 kg/ HL

Ibiforte Molibdeno + Boro: 150 - 200 cc/HL

FERTIRRIEGO

Ibisoil Ca Flow: 40 - 60 kg/ha

Ibicarbox Potasio: 30 - 40 lt/ha (2)

Ibiactive Amino: 3 - 4 kg/ha

Ibiactive Humic: 40 - 80 lt/ha

Se recomienda aplicar las dosis mayores en cultivos vigorosos o en plena producción. Para el caso de plantaciones jóvenes o con bajo vigor se sugiere aplicar la menor dosis descrita.
(1) Aplicar durante todo el ciclo del cultivo según análisis nutricional o al observar los primeros síntomas de deficiencia.
(2) Ajustar la dosis de Ibicarbox Potasio en una proporción del 10% del fertilizante potásico en base a sales utilizado.

